

## Les centres de vaccination de Royan Atlantique adaptent leur stratégie vaccinale face à la diminution provisoire de l'approvisionnement en vaccins

Devant la baisse de l'approvisionnement en vaccins, qui touche l'ensemble de la France, les deux centres de vaccination – Hôpital de Royan et clinique Pasteur – la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique et la ville de Royan se sont réunis jeudi 28 janvier pour définir la stratégie à adopter pour assurer les prochaines vaccinations.

Deux impératifs s'imposent aux soignants :

- Optimiser les 700 doses hebdomadaires dont le territoire est actuellement doté pendant les deux prochaines semaines.
- Privilégier la seconde dose de vaccination pour ne pas perdre le bénéfice de la première injection.

Pour répondre à ces deux objectifs, une stratégie claire est mise en œuvre à partir de la semaine 5 (1<sup>er</sup> au 7 février) :

- Déprogrammation de tous les rendez-vous pour les primo-vaccinations dès le 1<sup>er</sup> février
- Planification de toutes les secondes injections à partir de cette même date pour respecter le délai de 21 à 28 jours des premiers vaccinés.

Cette stratégie devrait permettre une reprise des rendez-vous pour les primo-vaccinations à partir de la semaine 9 (1<sup>er</sup> au 7 mars). Les informations concernant la réouverture des inscriptions seront diffusées au fur et à mesure de l'évolution des approvisionnements et de la connaissance par les centres de vaccination du volume des doses disponibles.

**La plateforme téléphonique de la CARA et le site internet Doctolib ne prendront donc aucun rendez-vous sur cette période.** Les équipes seront pleinement disponibles pour organiser et planifier l'ensemble des secondes injections sur la période concernée, mais aussi pour répondre aux interrogations dans la mesure des informations disponibles.

**Toutes les personnes inscrites pour un premier vaccin à partir du lundi 1<sup>er</sup> février seront informées individuellement de l'annulation de leur rendez-vous.**

Depuis le 4 janvier, plus de 2500 personnes ont reçu leur première injection (primo vaccinés). A partir du 1<sup>er</sup> février, nous entrons dans la phase de seconde injection, c'est-à-dire entre 21 et 28 jours pour une efficacité optimale du vaccin. Le nombre de doses dont les deux centres disposent par semaine permettront d'assurer la seconde injection, avant de reprendre le plus rapidement possible les prises de rendez-vous.